110年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、社會工作師考試、110年專門職業及技術人員高等考試心理師、法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師考試、高等暨普通考試驗光人員考試試題

代號：1102
頁次：8－1

等　　別：高等考試
類　　科：中醫師（二）
科　　目：中醫臨床醫學（一）（包括傷寒論（學）、溫病學、金匱要略、中醫證治學、中醫診斷學）
考試時間：1 小時 30 分　　座號：_____

※注意：㈠本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
㈡本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
㈢禁止使用電子計算器。

1 依《醫宗金鑑．傷寒論》條文所述，風溫可能出現的症狀，下列何者最不適宜？
㈠自汗出、身重　㈡發汗後、身灼熱　㈢口渴、不惡寒　㈣體痛、嘔逆

2 依《醫宗金鑑．傷寒論》太陽病，發汗後，大汗出，胃中乾，煩躁不得眠，脈浮，小便不利，微熱消渴者，治以下列何方最適宜？
㈠桂枝湯　㈡五苓散　㈢豬苓湯　㈣茯苓甘草湯

3 依《醫宗金鑑．傷寒論》所述：「傷寒發汗已解，半日許復煩，脈浮數者」，下列處置何者最適當？
㈠可更發汗，宜桂枝湯　㈡令自愈
㈢吐之愈，瓜蒂散主之　㈣宜麻黃湯

4 關於「傷寒若吐若下後，心下逆滿，氣上衝胸」若見下列脈證之治療處方，何者錯誤？
㈠脈浮緊，表仍不解，無汗、當用麻黃湯
㈡脈浮緊，表仍不解，有汗、當用桂枝湯
㈢起則頭眩，脈沉緊，發汗則動經，身為振振搖者，真武湯主之
㈣脈沉緊，不頭眩，以瓜蒂散吐之

5 關於霍亂的敘述，下列何者錯誤？
㈠夏秋最多，是風寒暑濕之邪，中人皆能病霍亂，非止一寒邪也
㈡若吐、利過甚，損傷上焦之氣，以致陰陽間隔，手足厥冷，脈微欲絕，不多飲水者，無分寒暑，皆宜四逆理中治之
㈢以飲食不節，寒熱不調，清濁相干，陰陽乖隔，而成霍亂
㈣夏月之時，復以冷風寒其形，冷水寒其胃，內外皆寒，風暑之邪，未有不乘虛入於陰經者

6 關於「藏結」之敘述，下列何者錯誤？
㈠按之痛，寸脈浮，關脈沉　㈡寸脈浮，關脈小細沉緊
㈢飲食如故，時時下利　㈣舌上白胎滑者，難治

7 依《醫宗金鑑．傷寒論》指出，大病瘥後，喜唾，久不了了，胸上有寒，下列何方治療最適當？
㈠理中丸　㈡小建中湯　㈢吳茱萸湯　㈣四逆湯

8 依《醫宗金鑑．傷寒論》指出，傷寒解後，虛羸少氣，氣逆欲吐，下列何方治療最適當？
㈠甘草瀉心湯　㈡黃耆建中湯　㈢竹葉石膏湯　㈣白虎加人參湯

9 依《醫宗金鑑．傷寒論》所述，問曰：「何緣得陽明病？」，其中太陽病，治療過程中，造成亡津液，胃中乾燥，因轉屬陽明，不更衣，內實，大便難者，此名陽明也。造成易傳變為陽明病承氣湯證的原因，下列何者最不適宜？
㈠誤用清熱法　㈡誤用下法　㈢治療時發汗過多　㈣治療時利小便太過

10 柴胡桂枝乾薑湯證之敘述，下列何者錯誤？
㈠少陽樞機不利，膽火內鬱，可導致三焦決瀆功能失常，水飲留結於中則胸脇滿微結
㈡水道失於通調，陽氣不得宣化，因而小便不利，為渴
㈢胃氣尚和，所以不嘔
㈣但頭汗出，乃是太陽表證

11 依《醫宗金鑑．傷寒論》所述：「陽明病，無汗，小便不利，心中懊憹者」，則會發生下列何種變證？
㈠攻其熱必噦　㈡久則譫語　㈢必苦頭痛　㈣身必發黃

12 依《醫宗金鑑．傷寒論》，有關抵當湯的運用，下列敘述何者錯誤？
㈠陽明證，其人喜忘者，必有蓄血。所以然者，本有久瘀血，故令喜忘。屎雖硬，大便反易，其色必黑者，宜抵當湯下之
㈡病人無表裏證，發熱七、八日，雖脈浮數者，可下之。假令已下，脈數不解，合熱則消穀善饑，至六、七日不大便者，有瘀血，宜抵當湯
㈢太陽病不解，熱結膀胱，其人如狂，血自下，下者愈。其外不解者，尚未可攻，當先解其外；外解已，但少腹急結者，乃可攻之，宜抵當湯
㈣太陽病，身黃，脈沉結，少腹硬滿，小便不利者，為無血也。小便自利，其人如狂者，血證諦，屬抵當湯

13 依《醫宗金鑑．傷寒論》：大汗出，熱不去，內拘急，四肢疼，又下利厥逆而惡寒者，下列何方主之？
㈠當歸四逆湯　㈡四逆散　㈢通脈四逆湯　㈣四逆湯

14 依《醫宗金鑑．傷寒論》少陰病，下利，咽痛，胸滿，心煩者，其病機為何？
㈠陰盛陽虛　㈡風熱實證　㈢熱邪下迫　㈣陰虛火炎

15 依《醫宗金鑑．傷寒論》少陰病，二三日不已，至四五日，腹痛，小便不利，四肢沉重疼痛，自下利者，其人或咳，或小便利，或下利，或嘔者，其病機為何？
㈠陽虛水泛　㈡瘀血內停　㈢痰食阻滯　㈣肝氣鬱結

16 關於太陰病之成因敘述，下列何者最不適宜？
㈠中陽不足，外受風寒，內傷生冷，太陰本身自病
㈡太陽病誤下，中傷邪陷，轉屬太陰
㈢陽明病清下太過，損傷脾陽
㈣太陽病發汗太過，轉屬太陰

17 依《醫宗金鑑．金匱要略》，關於痙病，下列何者錯誤？
㈠太陽病，無汗而小便少，氣上衝胸，口噤不得語，葛根湯主之
㈡痙為病，胸滿口噤，臥不得席，腳攣急，可與大承氣湯
㈢太陽病，身體強，几几然，脈反沉遲，栝蔞桂枝湯主之
㈣太陽病，發熱，脈沉而細者，大青龍湯主之

18 依《醫宗金鑑．金匱要略》，百合病下之後，治以下列何方？
㈠百合雞子湯　㈡百合地黃湯　㈢滑石代赭湯　㈣百合知母湯

19 依《醫宗金鑑．金匱要略》，下列敘述何者錯誤？
㈠諸肢節疼痛，身體魁羸，腳腫如脫，頭眩短氣，溫溫欲吐，桂枝芍藥知母湯主之
㈡病歷節不可屈伸，疼痛，烏頭湯主之
㈢寸口脈沉而弱，沉即主骨，弱即主筋，沉即為肺，弱即為腎，汗出入水中，如水傷心，歷節黃汗出
㈣盛人脈澀小，短氣，自汗出，歷節痛，不可屈伸，此皆飲酒汗出當風所致

20 依《醫宗金鑑．金匱要略》，傷寒八九日，風濕相搏，身體疼煩，不能自轉側，不嘔不渴，大便不堅，小便自利，脈浮虛而澀者，治以下列何方最適宜？
㈠桂枝附子湯　㈡麻黃附子湯　㈢白朮附子湯　㈣甘草附子湯

21 依《醫宗金鑑・金匱要略》,有關「射干麻黃湯」本方與「小青龍湯」的差異,下列敘述何者正確?
㈠射干麻黃湯治療痰飲,小青龍湯治療支飲
㈡射干麻黃湯治療眩暈,小青龍湯治療咳喘
㈢射干麻黃湯化寒飲祛痰,小青龍湯解表而蠲飲
㈣射干麻黃湯以乾薑溫肺,小青龍湯以乾薑和胃

22 依《醫宗金鑑・金匱要略》,有關腹滿之敘述,下列何者錯誤?
㈠病者腹滿,按之不痛為虛,痛者為實,可下之
㈡腹滿時減,復如故,此為熱,當與寒藥
㈢病腹滿,發熱十日,脈浮而數,飲食如故,厚朴七物湯主之
㈣腹滿不減,減不足言,當須下之,宜大承氣湯

23 依《醫宗金鑑・金匱要略》:膈間支飲,其人喘滿,心下痞堅,面色黧黑,其脈沉緊,得之數十日,醫吐下之不愈,下列何方主之?
㈠甘遂、半夏、芍藥、甘草　　㈡防己、椒目、大黃
㈢芫花、甘遂、大戟、大棗　　㈣木防己、石膏、桂枝、人參

24 依《醫宗金鑑・金匱要略》:皮水為病,四肢腫,水氣在皮膚中,四肢聶聶動者,防己茯苓湯主之。其中防己茯苓湯組成不包含下列何藥?
㈠白朮　㈡甘草　㈢桂枝　㈣黃耆

25 依《醫宗金鑑・金匱要略》條文與註解,關於「熱入血室」常見症候的敘述何者正確?
㈠婦人中風七八日,續來寒熱,發作有時,經水適斷,因血與熱搏,其血必結,故使如瘧狀,發作有時,故知:邪在少陽
㈡婦人傷寒,發熱無汗,經水適來,寒邪熱入血室,晝日明了,暮則譫語,如見鬼狀者,故知:邪在陽不在陰也
㈢婦人中風,發熱惡寒,經水適來,得之七、八日,熱除而脈遲,身涼,胸脅下滿,如結胸狀,譫語者,故知表解入裏,乘虛入血室
㈣陽明病,下血譫語者,此為熱入血室,血止熱不去,蓄於陽明,外越上蒸,導致但頭汗出

26 依《醫宗金鑑・金匱要略》所述,嘔而腸鳴,心下痞者,治以下列何方最適宜?
㈠吳茱萸、人參、生薑、大棗
㈡橘皮、竹茹、大棗、人參、生薑、甘草
㈢黃芩、炙甘草、芍藥、半夏、生薑、大棗
㈣半夏、黃芩、乾薑、人參、黃連、大棗、炙甘草

27 依《醫宗金鑑・金匱要略》有關嘔吐噦之敘述,下列何者最適當?
㈠患者胸中似喘不喘,似嘔不嘔,似噦不噦,徹心中憒憒然無奈者,百合知母湯主之
㈡諸嘔吐,穀不得下者,小半夏湯主之
㈢乾嘔,吐逆,吐涎沫,吳茱萸湯主之
㈣嘔家本渴,渴者為欲解,今反不渴,苓桂朮甘湯主之

28 依《醫宗金鑑・金匱要略》「嘔吐噦」的敘述,下列何者最適當?
㈠乾嘔、噦,若手足厥者,四逆湯主之　　㈡橘皮湯主治脾寒氣逆之證
㈢噦逆,手足溫者,大半夏湯主之　　㈣噦逆者,橘皮竹茹湯主之

29 溫病病變過程中可能產生痰飲,其產生的病機及治法,下列何者正確?
㈠病機可為病邪流連氣分,膀胱之氣化失司,導致津液無法正常布化而成痰飲
㈡病機可為熱邪內熾,熬煉津液而成痰濁,此屬痰熱互結
㈢若為痰濕內阻,臨床多見胸脘痞悶、泛噁欲嘔等,可於主治方中加入溫清飲之類治之
㈣若為痰熱壅肺,臨床症見咳嗽黃稠膿痰、苔黃黏膩等,治療宜於主治法中加入清肺化痰之品,如菖蒲、鬱金等

30 濕熱病後或溫病瘥後，邪熱雖已解除，但患者身體多未恢復正常狀態。下列患者的瘥後調理敘述，何者最正確？
㈠濕熱病後出現脘悶不暢，知飢不食，舌苔薄白微膩等症，此是餘邪未盡，當繼續以王氏連朴飲治之
㈡濕熱病後出現飲食不消，大便溏薄，四肢無力，舌苔薄白，脈虛弱等症，當以益胃湯調理
㈢溫病瘥後出現口乾，咽燥，唇裂，大便乾結等症，當以薛氏五葉蘆根湯調理
㈣溫病瘥後出現面色少華，氣虛倦怠，語音低微，舌質淡紅，脈虛無力等症，當以集靈膏調理

31 「溫病」一詞首見於下列何書？
㈠《傷寒論》 ㈡《金匱要略》 ㈢《內經》 ㈣《難經》

32 根據歷代醫學文獻之敘述，對於溫疫的解釋，下列敘述何者錯誤？
㈠《溫疫論》中指出：「其年疫氣盛行，所患為重，最能傳染」
㈡溫疫是指溫病中具有強烈傳染性並引起流行的一類疾病
㈢在疫病中除了溫疫之外還有寒疫
㈣按《辭源》：「瘟，疫病。人或牲畜家禽所生的急性傳染病」，因而瘟疫與溫疫的概念是相同的

33 就溫病的診法而言，下列何者主要反映「衛分和氣分」的病變？
㈠舌苔 ㈡舌質 ㈢發疹 ㈣神識

34 依《溫病條辨》，太陰溫病，發汗而汗不出或汗出過多，所引發後遺症的治方及用藥禁忌，下列何項錯誤？
㈠汗不出發斑者，化斑湯主治
㈡汗不出發疹者，銀翹散去豆豉，加細生地、丹皮、大青葉、倍元參主治
㈢斑疹治療禁用升麻、柴胡、當歸、防風、羌活、白芷、葛根、三春柳
㈣汗出過多必神昏譫語，生脈散合牛黃丸主治

35 風溫邪熱，傳入陽明，下列敘述那些最正確？①無形熱盛，熱熾陽明，症見壯熱面赤、惡寒、心煩、汗大出，苔黃而燥，渴喜涼飲，脈洪大 ②熱結旁流，利下純稀水，屬於腸中燥結熱實 ③下利多惡臭稀水，腹部按之作痛，為肺熱下移腸腑，腸熱迫注，宜用葛根芩連湯苦寒清熱止利 ④身熱自汗、面赤、神迷，身重難以轉側，多睡眠，鼻鼾，言語難出，苔黃而燥，脈數，宜用竹葉石膏湯泄熱救津
㈠①② ㈡①③ ㈢②④ ㈣③④

36 吳鞠通所說的「少陰溫病真陰欲竭、壯火復熾」之證，最宜用下列何方藥治療？
㈠炙甘草、乾地黃、白芍、麥冬、阿膠、麻仁
㈡青蒿、鱉甲、細生地、知母、丹皮
㈢炙甘草、乾地黃、白芍、麥冬、阿膠、龍骨、牡蠣
㈣黃連、黃芩、阿膠、芍藥、雞子黃

37 溫熱邪氣內陷，痰熱內閉心包，陽氣暴然外脫，脈散大，氣促如喘，治宜清心開竅，固脫救逆，下列何方最適宜？
㈠安宮牛黃丸合大定風珠 ㈡安宮牛黃丸合加減復脈湯
㈢安宮牛黃丸合參附湯 ㈣安宮牛黃丸合清宮湯

38 下列何者為白虎加人參湯在暑溫病使用之時機？
㈠暑傷氣營 ㈡津氣欲脫 ㈢暑入陽明胃 ㈣暑濕困阻中焦

39 春溫見高熱，煩渴，手足躁擾，甚則狂亂，神昏痙厥，或見頸項強直、角弓反張，舌紅苔黃，脈象弦數，宜用下列何方藥治療？
㈠羚角鉤藤湯加味 ㈡至寶丹 ㈢白虎湯加味 ㈣增液承氣湯

40 有關濕溫病中，濕濁蒙上、泌別失職之證型，其相關症狀或治療的敘述，下列何者錯誤？
⑷熱蒸頭脹，嘔逆神迷，小便不通，渴不多飲，舌苔白膩
⑻中焦濕濁久困所致之蒙上流下之證
⑽可先與芳香開竅，繼用淡滲分利
⑾應用雷氏芳香化濁法

41 濕溫患者，邪留少陽三焦，出現寒熱起伏，胸悶，脘痞，腹脹，溲短，苔膩等證候，下列何方劑治療最適宜？
⑷黃連溫膽湯　⑻大柴胡湯　⑽王氏連朴飲　⑾黃芩滑石湯

42 有一患者病秋燥，症見耳鳴、目赤、齦腫、咽痛，苔薄黃而乾，脈數，下列何組處方用藥最不適宜？
⑷銀花、連翹、桔梗、薄荷、竹葉、生甘草、淡豆豉、牛蒡子、荊芥穗
⑻杏仁、紫蘇葉、半夏、陳皮、前胡、甘草、桔梗、枳殼、茯苓、生薑、紅棗
⑽連翹、生甘草、薄荷、桔梗、黑梔皮、綠豆皮
⑾桑葉、杏仁、連翹、薄荷、菊花、桔梗、生甘草

43 關於「大頭瘟」的診斷要點及證候，下列何者錯誤？
⑷頭面部燉赤腫痛　⑻起病急
⑽發熱但不憎寒　⑾舌赤苔黃，脈數實

44 下列關於「秋季溫燥，病至後期燥熱漸退而肺胃津傷未復」證治之敘述，何者錯誤？
⑷外邪漸淨而未盡，故可見身熱而熱不甚之症
⑻肺陰傷故乾咳痰少，胃陰傷故口乾舌燥
⑽本證治則與「風溫」之肺胃陰傷相同，唯津傷甚時可合以五葉蘆根湯
⑾全證以津傷為主，而燥熱已輕，故宜甘寒滋潤，清養肺胃

45 有關中風的敘述，下列何者正確？
⑷中風急性期區分為中經絡與中臟腑，如《金匱要略》所言「邪在於經，肌膚不仁；邪在於絡，即重不勝；邪入於腑，即不識人；邪入於臟，舌即難言，口吐涎。」
⑻中臟腑的主要臨床表現為突然昏仆，不省人事，半身不遂等，但有閉證和脫證的區別
⑽閉症為陽閉於內，無法外達，症見牙關緊閉，口噤不開，兩手握固，二便不通，肢體強痙，多屬實證，急宜宣通陽氣
⑾脫症為陰脫於外，無法收斂，症見目合口開，鼻鼾息微，手撒遺尿，為五臟之氣衰弱欲絕，多屬虛證，急宜固攝陰氣

46 有關眩暈的敘述，下列何者最正確？
⑷眩暈多屬於心的病變，應先著重活血化瘀的治療為主
⑻眩暈發生在老年人為多
⑽眩暈之發生，屬於實證居多，可見肝火上炎證型
⑾《千金要方》首先提出風、熱、痰致眩的論點

47 李先生脅肋脹痛，走竄不定，胸悶不舒，下列選項何者正確？①屬肝氣鬱結之脅痛　②屬肝膽濕熱之脅痛　③宜柴胡疏肝散主之　④宜龍膽瀉肝湯主之
⑷①③　⑻①④　⑽②③　⑾②④

48 明．李中梓《醫宗必讀．不得臥》中提到「不寐之故，大約有五……」，下列敘述何者不包括在內？
⑷一曰氣虛，六君子湯加酸棗仁、黃耆
⑻一曰水停，輕者六君子湯加菖蒲、遠志，蒼朮，重者控涎丹
⑽一曰痰滯，溫膽湯加南星、酸棗仁、雄黃末
⑾一曰血瘀，血府逐瘀湯加酸棗仁、遠志

49 有關真心痛的敘述，下列何者錯誤？
㈠心胸持續疼痛，可達數小時或數天不止者，病情更重
㈡疼痛劇烈，可引及肩背、咽喉、脘腹等處
㈢真心痛的治療原則，不外「補、通」，以現代的觀點，通乃是預防血栓的形成
㈣真心痛常動輒汗出，若汗出，乃風邪已去，漸為好轉

50 有關癲癇敘述，下列何者錯誤？
㈠癲癇形成的病因以痰邪作祟最為重要
㈡出生時難產，導致顱腦受傷是病因之一
㈢突然昏仆、反復發作是癲癇證發病之特徵之一
㈣陽癇之治療以調理陰陽為主，宜採取補益氣血之法

51 有關呃逆、噯氣的敘述，下列何者錯誤？
㈠呃逆俗稱打嗝，古稱是指氣逆上衝出於喉間，是由胃氣上逆動膈而成
㈡噯氣又稱為「噦」，是胃之濁氣上逆、聲短而頻、不能自止的病證
㈢噯氣的形成，與水穀不能消化、陳滯宿積不化之氣上逆有關
㈣呃逆的病因病機，有胃積寒而氣逆、有胃熱而胃火上衝、有胃痰阻而氣逆、也有脾胃陽虛、或胃陰不足所致

52 便血色紅或紫黯，食少體倦，面色萎黃，心悸，少寐。舌質淡，脈細。治以下列何方最適宜？
㈠槐花散　㈡黃土湯　㈢歸脾湯　㈣地榆散

53 有關腹痛之敘述，下列何者錯誤？
㈠腹痛的範圍是指胃脘以下，恥骨毛際以上的部位發生疼痛
㈡虛寒性的腹痛可考慮以天香正氣散治療
㈢腹中拘攣，繞臍疼痛，冷汗出，怯寒肢冷，脈沉緊者，名為「寒疝」
㈣腹痛經久不癒。症見痛如針刺，痛處固定不移而拒按，可用少腹逐瘀湯治療

54 陳同學近來傷風咳嗽，下列辨證思路何者最正確？
㈠咳嗽聲重有力，痰稀薄，為痰濕蘊肺
㈡乾咳作嗆，痰黏、少，為痰濕蘊肺
㈢氣逆作咳，咽中伴有痰滯感為寒飲伏肺
㈣咳嗽氣粗或咳聲嘶啞，痰黏稠或黃為風熱犯肺

55 有關喘證的敘述，下列選項何者正確？①喘而呼吸深長，面赤身熱，臉面浮腫，為實證　②一般受寒或飲食不當而喘者，多屬於虛證　③痰色黃，稠黏，咳吐不利，口渴引冷，屬熱證　④呼吸微弱淺表，呼多吸少，慌張氣怯，舌質淡，屬虛證
㈠①②　㈡①④　㈢②③　㈣③④

56 感冒是由於六淫、時行病毒侵襲人體而致病，往往與當令之時氣相合而傷人，下列何者正確？
㈠春季易受風熱，怕冷重、發熱輕　㈡夏季多夾暑，身熱有汗、心煩口渴
㈢秋季多夾燥邪，胸悶、骨節疼痛　㈣冬季多屬風寒，鼻燥咽乾，乾咳無痰

57 某日吳同學在上課中打了噴嚏，伴隨著鼻涕，下列辨證何者最不適當？
㈠清涕是風寒及體虛衛氣不固　㈡涕黃黏為風寒化熱
㈢黏涕量多不斷，為寒濕阻滯，濁氣瀰漫　㈣涕中夾血，多為燥火上乾

58 有關淋證的敘述，下列何者錯誤？
㈠淋證的證候虛實可根據病程長短、有無尿痛、小便色澤及全身整體的陰陽失調情況來判定
㈡尿色淡紅1年，小便頻數，溲時疼痛澀滯不甚顯著，眩暈耳鳴，腰膝痠軟，五心煩熱，虛煩不眠，舌紅，少苔，脈細數，治以小薊飲子合導赤散
㈢50歲女性，10年前曾接受子宮全切除的手術，主訴術後出現少腹墜脹，尿有餘瀝，面色㿠白，舌淡，脈虛細無力，治以補中益氣湯
㈣60歲男性，主訴小便混濁多年，淋出如脂，澀痛反見減輕，伴見形瘦，頭昏，乏力，腰膝痠軟，舌淡，苔膩，脈細弱無力，治以膏淋湯

59 50歲女性，停經2年，西醫診斷骨質疏鬆症，主訴腰膝痠軟多年，怕冷，手足冰涼，面色㿠白，小溲清長，舌淡，脈沉細無力，治以下列何方最適當？
㈠《景岳全書》泰山磐石散　㈡《景岳全書》左歸丸
㈢《金匱要略》腎氣丸　㈣《傷寒雜病論》腎著湯

60 有關陽痿的敘述，下列選項何者正確？①由於恣情縱慾、思慮、憂鬱、驚恐所傷者，多為脾腎虧虛，命門火衰，屬於虛證；由於肝鬱化火，濕熱下注，宗筋弛縱者，屬於實證　②命門火衰者，陽氣既虛，真陰多損，宜用剛熱燥澀之劑；濕熱下注者，治用苦味堅陰，淡滲去濕　③45歲男性，西醫診斷男性不孕症（精子過少症），主訴早洩多年，伴見面色㿠白，頭暈目眩，精神萎靡，腰膝痠軟，苔薄白，脈沉細，治以補腎溫陽，處方為《攝生眾妙方》五子衍宗丸　④55歲男性，主訴性功能低下多年，伴見精神不振，面色不華，心悸怔忡，健忘失眠，舌淡，苔薄白，脈細緩，治以補益心脾，處方為《濟生方》歸脾湯
㈠①②③　㈡①②④　㈢①③④　㈣②③④

61 遺精、勞甚輒發、肢體困倦、食少便溏、面色萎黃、失眠健忘、心悸怔忡、舌淡、苔薄、脈弱，治宜下列何方？
㈠妙香散　㈡六味地黃丸　㈢桑螵蛸散　㈣黃連清心飲

62 18歲女性，主述時時汗出，汗出量多，兼隨著心悸，睡眠時間短，易醒後不能再眠，精神疲憊，呼吸氣短，面色蒼白，舌質淡，脈細，下列診斷及其治療何者正確？
㈠心血不足，方用歸脾湯　㈡肺衛不固，方用桂枝湯
㈢陰虛火旺，方用當歸六黃湯　㈣邪熱鬱蒸，方用龍膽瀉肝湯

63 《丹溪心法．消渴》治消渴應當以下列那些為主？①補氣　②養肺　③降火　④生血
㈠僅①③　㈡僅②④　㈢①②③　㈣②③④

64 《諸病源候論》對於「歷節風」之描述，有「……自汗出，歷節疼痛不可忍，屈伸不得是也。……」其中自汗出之原因，下列何者正確？
㈠血氣虛　㈡衛氣強　㈢濕熱盛　㈣風冷盛

65 52歲男性，發病時因為怕冷、頭痛、打噴嚏、流鼻水等感冒症狀至診所就醫，雖服藥治療，而後卻出現發燒攝氏39度、咳嗽、胸悶痛、咳出鐵銹色痰，胸部X光發現右肺下葉片狀浸潤。經送急診以抗生素控制後住院，住院7日後發燒漸退，但卻出現疲倦、右胸悶痛，頻頻咳出黃稠味腥臭的大量痰液，苔黃厚，脈弦滑數。痰液培養出現革蘭氏陰性菌。因持續使用抗生素效果不佳，只得以胸管引流。至此際，病人臨床症狀的辨證以下列何者最適宜？
㈠風寒外束　㈡痰濁壅肺　㈢肺熱釀膿　㈣痰瘀胸痹

66 62歲男性，來診時主訴陣發胸悶心悸已經5年。某醫學中心24小時心電圖檢查發現每日有頻發性心室早期收縮（VPC）達16,000次，占總心律11.7%。雖有服西藥控制，胸悶心悸仍每日發作，尤其是在飽食後或運動後更易發作，影響食慾。望之面色黃白少華，體瘦，問之平時因擔心病情未能順利控制，心情憂鬱多思慮，食慾減退，但睡眠尚可。因心律不整，導致不敢多吃，近5年來體重下降近7公斤。苔薄少，脈沉細弦無力。綜合上述臨床表現，下列病機何者最不適宜？
㈠心氣虧虛　㈡心脾兩虛　㈢肝鬱脾虛　㈣肝火擾心

67 關於望診，下列敘述何者最不適宜？
㈠腮腫是腮部突然腫起，面赤咽痛，是溫毒證
㈡水疝是陰囊腫大，用光線照射呈透明
㈢望唇系帶診法，是根據上唇系帶的小白點，來診斷積滯
㈣瘰癧是在頸側頷下，腫塊如壘，累累如串珠，多由肺腎陰虛，或感受風火時毒

68 頸脈動明顯又稱「大筋起落」，最有助於下列何病之診斷？
㈠水病 ㈡氣病 ㈢熱病 ㈣筋病

69 關於舌苔之觀察，下列敘述何者最不適宜？
㈠染苔為外物沾染，與病理無關
㈡舌苔白薄而潤，舌質淡紅，合併惡寒等症，多見於風寒外感初起
㈢外感熱症多見於舌苔白薄而乾，舌質較紅
㈣寒濕積滯常見白粉鋪舌，刮之則去

70 若患者見黃苔，則下列辨證何者最適宜？
㈠邪在太陽 ㈡邪在少陽 ㈢邪在陽明 ㈣邪在太陰

71 舌診若見光滑舌，則為下列何者萎縮所致？
㈠絲狀乳頭及輪廓乳頭 ㈡絲狀乳頭及蕈狀乳頭
㈢蕈狀乳頭及輪廓乳頭 ㈣輪廓乳頭及葉狀乳頭

72 以寒熱的輕重來觀察邪正盛衰，下列敘述何者最不適宜？
㈠邪氣外襲，體表必先惡寒，陽氣不能發泄，因而發熱
㈡邪輕正盛，惡寒輕而發熱重
㈢邪正都盛，惡寒發熱都重
㈣邪盛正衰，惡寒重而發熱輕

73 關於脈象之敘述，下列何者最不適宜？
㈠緊脈：脈來繃急，狀如牽繩轉索 ㈡牢脈：沉按實大弦長
㈢結脈：脈來一止，止有定數，良久方來 ㈣濡脈：浮而細軟

74 一位2歲女童前來就診，關於下列診脈分析，何者最不適宜？
㈠一息七至為數脈，多為熱證
㈡脈氣止於中候，重按不見，乃腎氣未充所致
㈢小兒臨診驚哭，診脈當配合形色、食指絡脈等合參
㈣脈象沉滑，可能與痰食相關

75 下列何者屬內風的範疇？
㈠破傷風 ㈡周邊顏面神經麻痺 ㈢手足震顫 ㈣關節痛

76 依《黃帝內經．素問》，善診者，察色按脈，先別何者？
㈠氣血 ㈡寒熱 ㈢表裏 ㈣陰陽

77 關於太陽經頭痛，下列敘述何者最適宜？
㈠前額部反覆頭痛，鼻塞流涕 ㈡顛頂部頭痛，並有想吐的感覺
㈢月經來時左顳部抽痛，身體煩熱 ㈣突然發燒惡寒，頭頂至後腦勺痛

78 以六經辨證而言，那一階段屬「陽氣亢盛，邪從熱化最盛」？
㈠太陽病 ㈡少陽病 ㈢陽明病 ㈣厥陰病

79 17歲男性患者在過年出國旅遊回來後，出現咳喘，痰液稀白，形寒肢涼，無發熱，舌淡苔白，脈遲緩，下列診斷何者最適宜？
㈠痰濕阻肺 ㈡飲停於肺 ㈢寒邪客肺 ㈣風寒束肺

80 46歲中年男性，體格壯實，主訴口臭便秘，胃痛灼熱感，平素口渴喜冷飲，偶見牙齦出血，下列敘述何者最不適宜？
㈠可診斷為胃陰虛證 ㈡若合併吞酸嘈雜，多與肝經鬱火橫逆侮土有關
㈢牙齦出血，乃火循胃絡上攻於齦 ㈣常合併有善飢的臨床表現